Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen

Dimitrios Drakopoulos^{1,2}, Susanne Vogelgsang¹

¹ Ökologischer Pflanzenschutz im Ackerbau, Agroscope, Zürich-Reckenholz

² Nachhaltige Agrarökosysteme, ETH Zurich

Pflanzenschutztagung Feldbau, IAG, Grangeneuve (FR), 29.01.2020

www.agroscope.ch | Gutes Essen, gesunde Umwelt

ETH zürich

<http://www.mycokokey.eu/mycokey-objectives/#>

“Entwicklung von integrierten, nachhaltigen und innovativen Lösungen, um das Risiko von Mykotoxinbelastungen in wirtschaftlich wichtigen Lebens- und Futtermitteln zu verringern”

ARBEITSPAKETE:

1. GLOBAL MYCOTOXIN KNOWLEDGE
2. TOXIGENIC FUNGI MONITORING
3. MYCOTOXIN MONITORING
- ➔ 4. VERMEIDUNG IM FELD ... ZUR REDUKTION VON FUSARIEN UND MYKOTOXINEN
5. INTERVENTION STRATEGIES
6. REMEDIATION
7. ICT SOLUTIONS
8. COMMUNICATION, DISSEMINATION
9. PROJECT MANAGEMENT
10. ETHICS REQUIREMENT

**Lebenszyklus von *F. graminearum*
(Hauptfruchtform *Gibberella zeae*)**

Die wichtigste Fusarien-Art

**Lebenszyklus von *F. graminearum*
(Hauptfruchtform *Gibberella zeae*)**

Die wichtigste Fusarien-Art

Hoher Krankheitsdruck bei...

- Anfälligen Wirtspflanzen (z.B. Mais-Weizen-Fruchtfolge)
... *aber immer noch verbreitet*
- Reduzierter Bodenbearbeitung
... *aber mehrere Vorteile*

- Geringere Erosion & erhöhte Fruchtbarkeit
- Höhere biologische Aktivität im Boden

- Management der Erntereste
- Erhöhte Abhängigkeit von Herbiziden

- Daher sind Lösungen gefragt...

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

5

Bekämpfung mit Fungiziden

Meta-Analyse > 100 Fungizid-Versuche in den USA

Wirkung in Prozent

Paul et al. *Phytopathology* (2007)
Paul et al. *Phytopathology* (2008)
McMullen et al. *Plant Disease* (2012)

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

6

Ziel und Ansatz

Anbausysteme entwickeln, die das *Fusarium*-Inokulum und Mykotoxine in Weizen in einer Mais-Weizen-FF bei reduzierter Bodenbearbeitung verringern

Drei Versuchsansätze:

- A. "Cut-and-carry" Biofumigation und Naturstoffe
- B. Mais-Untersaat
- C. Zwischenfrüchte

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

7

A. Biofumigation & Naturstoffe

Simulation einer Mais-Weizen-FF ohne Bodenbearbeitung und Inokulation von Maisstängeln

Drakopoulos et al. *Field Crops Research* (2020)

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

8

+ A. Biofumigation & Naturstoffe

Applikation von frischem **Mulchmaterial** im Herbst, "cut-&-carry" Biofumigation

- Weisser Senf
- Braunsenf
- Alexandrinerklee

Spritzen von **Naturstoffen** (4% w/v) im Herbst oder im Frühling

- Senf 1
  - Senf 2
  - Chinesische Galle
- | Samenmehl aus weissem Senf

Drakopoulos et al. *Field Crops Research* (2020)

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

9

+ A. Biofumigation & Naturstoffe

Aufbau Feldversuch:

- Hauptparzellen → Mulchmaterial, Naturstoffe, pos. & neg. Kontrollen
- Unterparzellen → Weizensorten

Levis & Forel

Fusarium und Mykotoxine in Weizen

Drakopoulos et al. *Field Crops Research* (2020)

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

10

A. Biofumigation & Naturstoffe

Mykotoxine – Jahr 1

DON in Weizen (mg kg⁻¹)

ZEN in Weizen (mg kg⁻¹)

Drakopoulos et al. *Field Crops Research* (2020)

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

11

A. Biofumigation & Naturstoffe

Mykotoxine – Jahr 2

DON in Weizen (mg kg⁻¹)

ZEN in Weizen (mg kg⁻¹)

Drakopoulos et al. *Field Crops Research* (2020)

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

12

A. Biofumigation & Naturstoffe

Warum Senf-basiertes Mulchmaterial & Naturstoffe?

Phenolische Säuren

	Senf 1	Senf 2
Glucosinolate Sinalbin (mg/g)	56.4	57.5
Isothiocyanate p-HBITC (mg/g)	2.56	2.44
Phenolic acids (mg/kg)		
1-2-Dihydroxybenzene	2.21	nd
3-4-Dihydroxyhydrocinnamic	0.13	0.2
Benzoic acid	6.35	11.83
Caffeic acid	0.21	nd
Chlorogenic acid	nd	nd
DL-3-Phenylactic acid	2.12	0.34
Ferulic acid	6.46	0.33
Galic acid	0.12	nd
Hydroxycinnamic acid	26.12	0.52
P-Coumaric acid	0.35	0.21
Protocatechuic acid	1.28	0.25
Sinapic acid	0.57	0.27
Syringic acid	0.13	0.11
Vanillic acid	0.48	nd
Vanillin	0.29	0.21

Drakopoulos et al. *Phytopathology* (2019)

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

13

A. Biofumigation & Naturstoffe

Warum Chinesische Galle?

Gallsäuren

Compound	Calculated masses (Da)	Relative abundance (%)
→ Gallic acid	170.0348	19
GG	332.1129	2
2-GG	484.1289	1
3-GG	636.1294	4
4-GG	788.1872	2
5-GG	940.2873	1
6-GG	1092.2381	1
7-GG	1244.2296	1
9-GG	1548.2471	3
→ Tannic acid	1700.2751	54
11-GG	1853.2861	5
12-GG	2005.3059	1
14-GG	2309.3371	2
15-GG	2461.3385	4

GG = galloylglucopyranose

Drakopoulos et al. *Phytopathology* (2019)

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

14

A. Biofumigation & Naturstoffe

Zusammenfassend...

Mulchmaterial aus Weisssem Senf/Braunsenf oder Alexandrinerklee reduzierten konstant die Mykotoxingehalte in Weizen

Naturstoffe hatten eine gute Wirkung *in vitro*, waren unter Feldbedingungen aber variabel

B. Mais-Untersaat

- Land- & Ressourcen-Effizienz
- Biodiversität
- Weniger Nährstoffverlust und Erosion
- Unterdrückung Unkräuter
- Vorteile von zwei Kulturen
  - ❖ Bekämpfung von Schädlingen durch Anziehung von Nützlingen
  - ❖ Bekämpfung von Pathogenen (bodenbürtig oder in Ernteresten)?

- Wettbewerb → Ertragsverluste?
- Zunahme der Betriebskosten?

Mais ohne Untersaat

Mais-Klee-Untersaat

+ B. Mais-Untersaat

Split-split plot Design mit 4 Blöcken:

Hauptparzellen: Bodenbearbeitung

Unterpzellen: Mais-Untersaaten-System

Unter-Unterpzellen: Weizensorte

+ B. Mais-Untersaat

Unterpzellen: Mais-Untersaat

Ohne Untersaat

Braunsenf

Rotklee

Sorghum

Weisser Senf

Phazelia

Hauptparzellen: Bodenbearbeitung

No Till (Mulch)

Reduzierte Bodenbearbeitung
(Rotary Tiller ~10cm)

B. Mais-Untersaat

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

19

B. Mais-Untersaat

Mais-Ertrag (t ha⁻¹)

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

20

B. Mais-Untersaat

Weizenkörner: Anteil von Arten, die Ährenfusariosen verursachen - natürliche Infektion

FG: *F. graminearum*
 FP: *F. poae*
 FA: *F. avenaceum*
 M: *Microdochium* spp.
 Andere: andere *F.*-Arten

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
 Dimitrios Drakopoulos

21

B. Mais-Untersaat – DON

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
 Dimitrios Drakopoulos

22

♣ B. Mais-Untersaat – DON

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

23

♣ B. Mais-Untersaat

Brutto-Gewinn Körnermais-Winterweizen-FF

No-Till

Ohne Untersaat: 3471 F ha⁻¹

Mais-Untersaaten: 14-25%

Reduzierte Bodenbearbeitung

Ohne Untersaat: 3505 F ha⁻¹

Mais-Untersaaten: 12-18%

Unterschiede durch höhere Betriebskosten:

- Herbizide in Mais ohne Untersaat: 136 F ha⁻¹
- Aussaat Untersaaten: 167-398 F ha⁻¹

...und Ertragsunterschiede

Mais ohne Untersaat

Mais-Weisser Senf-Untersaat

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

24

B. Mais-Untersaat

Zusammenfassend...

- Mais-Untersaaten führten nicht zu signifikanten Ernteverlusten
- *F. graminearum* war die wichtigste Fusarien-Art
- Mais-Untersaat mit Weisssem Senf und Braunsenf reduzierten die Mykotoxine in Weizen signifikant...

...Aber

- Höhere Kosten
- Mykotoxinreduktion nicht ausreichend bei sehr hohem Krankheitsdruck

C. Zwischenfrüchte

C. Zwischenfrüchte – DON

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

27

C. Zwischenfrüchte – DON

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

28

C. Zwischenfrüchte

Brutto-Gewinn Silomais-Sommerweizen-FF

Keine Zwischenfrucht - Herbizid: 1263 Fr. ha⁻¹

Zwischenfrüchte: 7-14% ↓

Übersicht

Beste Wirkung:

- Weisser Senf/Braunsenf & W-Erbse als Zwischenfrüchte
- Cut-&-carry Biofumigation mit Senf und Klee

Variable Wirkung:

- Mais-Senf-Untersaaten
- Applikation von Naturstoffen auf infizierte Mais-Erntestereste

Zusätzlicher agronomischer Nutzen:

- Unkrautkontrolle, N-Düngung, OBS, on-farm Biodiversität
- Reduzierte Abhängigkeit von synthetischen PSM

Wirtschaftliche Abstriche

→ Agrarpolitik müsste Getreideproduzenten unterstützen

Danke

ETH zürich

Ökologischer Pflanzenschutz im Ackerbau, Agroscope, Zürich-Reckenholz

Susanne Vogelgsang	Tomke Musa
Andreas Kägi	Pascal Weber
Alejandro Gimeno	Anja Marty
Eveline Jenny	Nicole Togni
Irene Bänziger	Sibel Dugan
Hans-Rudolf Forrer	Fabian Hess

Johan Six und Mitarbeitende 'Nachhaltige Agrarökosysteme', ETH Zürich
 Thomas Bucheli, Felix Wettstein und Mitarbeitende 'Umweltanalytik', Agroscope
 Feldequipe in Agroscope-Reckenholz and -Tänikon
 Alexander Zorn, Wettbewerbsfähigkeit und Systembewertung, Agroscope
 Giuseppe Meca, Food Toxicology, University of Valencia
 GS Dunn Mustard Dry Millers, Canada
 MycoKey EU Projekt

Agroscope

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

31

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Agroscope gutes Essen, gesunde Umwelt

Agroscope

Innovative Anbausysteme und Biopestizide zur Vermeidung von Mykotoxinen in Weizen
Dimitrios Drakopoulos

32